

Permetezzünk meg minden gyümölcsfát

A kötelezően előírt fatisztogatási munkálatokon kívül, minden egyes gyümölcsfát szakszerűen le kell permetezni, hogy a fák termés hozamát és a dolgozó nép gyümölcscellátását biztosíthassuk. A zárt gyümölcsösökben, házikertekben és a szőlők között lévő gyümölcsfákon az alábbiak szerint végezzük el a kötelező permetezést:

ALMA- ÉS KÖRTEFÁKON

a) **Rügyfakadás előtt:** Kaliforniai pajzstetűvel erősen fertőzött fák permetezését, egyéb kártevők figyelembevételével, az alábbi változatok egyikével végezzük. Rügypattanás előtt hl-ként 5 kg gyümölcsfa-olajat tartalmazó permetlével, vagy előírt töménységű gyümölcsfa-karbolineummal;

ha erős pajzstetű-fertőzésen kívül erős bimbólikasztó és sodrómoly (al-mailonca stb.) kártétellel is számolni kell, rügypattanáskor hl-ként 2 kg sárgaméregoldattal, amelynek gombaölő hatása is van. Kaliforniai pajzstetűvel közepesen vagy gyengén fertőzött fákat rügypattanáskor téli hígítású mészkénlével kell permetezni. Erősen lisztharmatos fáknál a mészkénléhez hl-ként 20 dkg, meleg vízben oldott vasgálicot keverünk. Gyümölcsfa-olajjal az erősen pajzstetűvel fertőzött fákat kell permetezni. Az olajos permetezés a pajzstetű-fertőzést erősen lecsökkenti úgy, hogy utána pár évig elegendő a mészkénlével való permetezés.

b) **Rügyfakadáskor:** Varasodás ellen egyszázalékos bordói lével (hl-ként 1 kg rézgálic és a közömbösítéshez szükséges mész) permetezzünk. A bordói lével való permetezést, ha rügypattanás előtt gyümölcsfa-olajjal permetezzünk, utána legalább egy héttel kell elvégezni, hogy a bordói lé a fákon jól megtapadhasson.

Rügypattanáskor alkalmazott sárgamérges permetezés után bordói lével permetezni nem kell. Erősen lisztharmatos fákat zöldbimbós állapotban, töményebb, nyári hígítású mészkénlével kell permetezni, amelyhez hl-ként előzetesen meleg vízben oldott, 20 dkg kristályos vasgálicot, 25 dkg Mavepont keverünk.

c) **Rügyfakadás után:** Varasodás ellen pirosbimbós állapotban 1 %-os bordói lével kell permetezni. Lisztharmat ellen töményebb, nyári hígítású mészkénlével kell permetezni, amelyhez a b) pontban közölt mennyiségű vasgálicot és Mavepont kell adni.

d) **Sziromhullás után** a permetezést az előírások szerint végezzük addig, amíg arra szükség van.

KAJSZI- (SÁRGA-, RÓZSA-) BARACKFÁKON

a) **Rügyfakadás előtt:** Pajzstetű és gombabetegségek ellen a fákat, a termőrügyek pattanása és a rügyfakadás között, téli hígítású mészkénlével kell lepermetezni.

b) **Rügyfakadás után:** Gombabetegségek (clasterospórium) ellen, fehérbimbós állapotban, 1 %-os bordói lével (1 kg rézgálic és a közömbösítéshez szükséges mész) védekezzünk.

Kaliforniai pajzstetű ellen, rajzás idején, szükség szerint hl-ként 1 kg káliszappan, 15 dkg nyersnikotin oldatával permetezzünk.

CSERESZNYE- ÉS MEGGYFÁKON

a) **Rügyfakadás előtt:** A rovarkártevők (pajzstetvek) és a gombabetegségek ellen a termőrügyek pattanása és a rügyfakadás között téli hígítású mészkénlével kell permetezni.

b) **Rügyfakadáskor:** Gombabetegségek ellen fehérbimbós állapotban egyszázalékos bordói lével.

c) **Rügyfakadás után:** Cseresznyelég ellen akkor kell permetezni, mikor a gyümölcs színe haragoszöldből sárgába megy át, és Pernittel, melyből hl-ként 0,4 kg szükséges egy hl permetlé elkészítésére.

SZILVA- ÉS RINGLÓFÉLEKEN

a) **Rügyfakadás előtt:** Erős pajzstetű-fertőzés esetén a termőrügyek pattanása előtt (4 kg gyümölcsfa-olaj, 100 liter víz) gyümölcsfa-olajos permetlével lemosásszerűen permetezzünk. Közepes és gyenge pajzstetű-fertőzéskor a termőrügyek pattanása és a rügyfakadás között téli hígítású mészkénlével kell permetezni.

b) **Rügyfakadáskor:** Gombabetegségek ellen fehérbimbós állapotban egyszázalékos bordói lével permetezzünk.

c) **Rügyfakadás után:** A poloskaszagú szilvadarázs ellen, közvetlenül a szíromhullás után, hl-ként 2 kg HCH permetezőszerszerrel vagy 2 %-os Kvasszia-főzettel permetezzük gyümölcsfainkat. (Hl-ként 2 kg Kvasszia-forgácsból készült főzet + 1 kg káliszappan.)

Pajzstetvek ellen, rajzás idején, hl-ként 1 kg káliszappan, 15 dkg nyersnikotin oldatával permetezzünk.

ÖSZIBARACK-FÁKON

a) **Rügyfakadás előtt:** Gombabetegségek ellen a termőrügyek pattanása előtt 2 %-os bordói lével.

b) **Rügyfakadáskor:** Levéltetvek ellen rügyfakadástól kezdve, szükség szerint, hl-ként 1 kg káliszappan, 10 dkg nyersnikotin oldatával permetezzünk.

c) **Rügyfakadás után:** Gombabetegségek ellen, a piros-bimbós állapot kezdetén, 1 %-os bordói lével, levéltetvek ellen rügyfakadástól kezdve káliszappanos nikotin-oldattal, vagy 1 %-os Kvasziával kell permetezni.

KÖSZMÉTÉN, RIBIZKÉN

a) **Rügyfakadás előtt:** Erős pajzstetű-fertőzés esetén a termőrügyek téli hígítású mészkénlével permetezzünk.

b) **Rügyfakadáskor:** Rügyfakadás és virágzás között töményebb, nyári hígítású mészkénlével permetezzünk a gombabetegségek ellen.

c) **Rügyfakadás után:** Közvetlen szíromhullás után a gombabetegségek ellen hígabb, nyári hígítású mészkénlével, amit később még meg kell ismételni a lisztharmat ellen. Egyes köszmétefajták, különösen a piros színű boggyójuak a mészkénlőre érzékenyek, ezért e fajtákon ventilált kénport használjunk védekezésre.

A GYÜMÖLCSFÁK VIRÁGZÁSA IDEJÉN ARZÉN-, BŐR- ÉS IDEGMÉREG-TARTALMÚ SZEREKKEL PERMETEZNI A MÉHEK MIAATT NEM SZABAD!

Az előírt kötelező permetezést a 18018/1951. FM. számú rendelet és a 49/1953. FM. sz. együttes miniszteri utasítás alapján, minden termelő úgy tartozik elvégezni, illetve elvégeztetni, hogy az minden zárt gyümölcsösben, házikertben és a szőlők között lévő, minden egyes gyümölcsfán végrehajtást nyerjen. A permetési munka végrehajtását a községi, városi, járási, és a megyei tanács v. b. mezőgazdasági osztályai, nemkülönben a megyei növényvédő állomás szigorúan ellenőrzi. Aki az előírt permetezést nem végzi el, annak saját költségére fogja a községi, városi tanács v. b. mezőgazdasági csoportja elvégeztetni a védekezést.

Kecskemét, 1959. február hó.

**Bács-Kiskun megyei Tanács V. B.
Mezőgazdasági Osztálya, Kecskemét**